

مؤتهرات

حقام سيادته بتنظيم وتنفيذ الملتقى المعلوماتى الاول لمؤتمر تنمية الصناعة المصرية تحت عنوان (مستقبل مصر .. صناعة مصر) وذلك ضمن فعاليات مبادرة (بكل فخر صنع فى مصر) التى نجمت فى تحقيق الأهداف المطلوبة فى تشجيع المنتج المصرى في ١٥ / ١٨ /٢١٠١.









﴿شَارِكَ سِيادته في المؤتمر العلمي لسموم الغذاء في أفريقيا المقام بجامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة هوكايدو باليابان والممول من هيئة تطوير العلوم اليابانية وقام سيادته بإلقاء كلمة المؤتمر فی ۲۰۱۲/۸/۳۰ فی





Food-borne intoxication

Ebied Saleh, Ph.D.

Professor of Food Hyglene, Food Control Department, Faculty of Veterinary Medicine, Damanhur University, Egypt

Food poisoning is a common, yet distressing and sometimes life-threatening problem for millions performed toxins may be symptom-free or may have symptoms ranging from mild intestinal discomfort to of food poisoning.

Food borne-intoxication includes mainly two types of food poisoning botulism and Staph, aureus

The bacterium *Clostridium botulinum* is responsible for causing the rare but serious illness botulism. Foodborne botulism is caused by eating foods that contain the botulism toxin. Botulism can be deadly and eyelids, slowed or slurred speech, difficulty swallowing, dry mouth and muscle weakness. If these symptoms are untreated, they may lead to paralysis of the arms, legs, trunk, and respiratory muscles. Symptoms of foodborne botulism usually develop 18 to 36 hours after consuming contaminated food, but symptoms can occur as early as six hours or as late as a week to 10 days.

Staph food poisoning is a type of food poisoning caused by infection with the Staphylococcus aureus (S. aureus) bacterium. The bacteria multiply in foods and produce toxins especially if food is kept at room temperature. The toxins may be present in dangerous amounts in foods that have no signs of spoilage, such as a bad smell. Symptoms of staph food poisoning include nausea, vomiting, retching, stomach cramping, and diarrhea. In more severe cases, dehydration, headache, muscle cramping, and changes in blood pressure and pulse rate may occur. Symptoms typically come on quickly. The condition is typically over in 2 days. But it is not unusual for complete recovery to take 3 days and sometimes longer in severe cases. In this lecture we will give a full account on food-borne intoxication and other cases of food-borne infection.

﴿شارك سيادته في مؤتمر اتحاد رؤساء الجامعات اليورومتوسطية ببرشلونة في الفترة من (۲۲/۹/۲۷) حتى ٣٠ / ٩ / ٦ (٢٠١٦) وقام سيادته بإلقاء محاضرة متميزة عن دور جامعة دمنهور في توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل

بتنمية الجانب المهارى والعملى لدى الطلاب.







حقام سيادته بتنظيم وتنفيذ المؤتمر العلمى الأول لطب الحيوان تحت عنوان (رؤية مستقبلية في تشخيص وعلاج أمراض الحيوان) بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٦ الذي يهدف إلى:

- استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة في مقاومة أمراض الحيوان وذلك للوصول إلى غذاء آمن لكل مواطن في المجتمع البحراوي.
 - دراسة الادوية الجديدة وآثارها على الحيوان.
- اتباع طرق جديدة للرعاية البيطرية من اجل المحافظة على الثروة الحيوانية.
 - كيفية مقاومة الامراض الوبائية التي تضر بالإقتصاد القومي.









شهادة





قسم طب الحيوان - كلية الطب البيطرى - جامعة دمنهور بأن السيد الدكتور/ محبر محبر العرب كي مرب فقد حضر المؤتمر العلمي الأول لقسم طب الحيوان تحت عنواي (رؤية مستقبلية في تشخيص وعلاج أمراض الحيوان)

(Future vision in the diagnosis and treatment of animal diseases)

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠١٦ وهذك شهاجة منا بخلك الراعي الرسمي للمؤتمر (شركة سما فيت فارم مي الرسمي للمؤتمر (شركة سما فيت فارم)

أ.د الهاني فوزي اللقاني

عميد كلية الطب البيطرى بدمنهور

أ.د / نبيل محمد بكير رئيس قسم طب الحيوان